



## 行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 107 年 01 月 25 日

### 避免荔枝椿象危害，臺中場籲請民眾及早防治

為避免荔枝椿象越冬後擴散、繁殖，造成經濟損失及人體危害，行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農友應把握時機，即刻加強荔枝、龍眼果園與臺灣欒樹、無患子等路樹的管理，進行藥劑防治並適時施放天敵。

該場于逸知助理研究員表示，每年春季為荔枝椿象的主要繁殖期，亦為防治關鍵期。越冬後的荔枝椿象對藥劑耐受度較低，活動力較差且尚未產卵，此時防治可達到最佳的防治效果；民眾可參考植物保護推薦藥劑，如亞滅培、賽洛寧或陶斯松等，並應加強葉背與枝條縫隙的施藥；園內如發現卵塊則應儘早移除、銷毀。荔枝椿象受干擾後，會由背部臭腺噴射具有刺激性的分泌物，將造成人體灼傷。該場呼籲農友於田間作業時，應做好身體防護，以免造成身體灼傷；若不慎沾染其分泌物，應儘速就醫，以免傷口感染。

臺中場指出，由於龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑誤殺，建議農友應提早停藥，並搭配平腹小蜂卵片施放，進行整合性防治。建議於 1 月下旬至 2 月底每週施藥一次，並於開花前(施放小蜂前)10 天停藥，停藥期間可配合施放小蜂，以確保防治效果。購買平腹小蜂卵片可向臺灣大學昆蟲系抗藥性管理實驗室(電話:02-3366-5526)洽詢。

聯絡人：臺中區農業改良場農業推廣課 蔡本原助理研究員

電話：04-8523101#420

e-mail：[tsaiby@tdais.gov.tw](mailto:tsaiby@tdais.gov.tw)

撰稿人：臺中區農業改良場作物環境課 于逸知助理研究員

電話：04-8523101#320

e-mail：[onefish@tdais.gov.tw](mailto:onefish@tdais.gov.tw)



荔枝椿象會藏匿於枝叢間，防治時藥劑應加強處理枝條隱蔽處。