

水稻台中秈2號

Rice Taichung Sen 2

撰稿：許志聖、楊嘉凌

一、**品種名稱**：水稻 (*Oryza sativa* L.) 台中秈2號

二、**親 源**：低腳烏尖×白米粉

三、**育成時間**：1966年命名推廣

四、**育 成 者**：

育種工作主持人：余慶東

雜交及後代選拔：洪秋增、林克明

產量試驗：洪秋增、蔡民、林寶鑫

五、**育成經過**：1949年第2期作雜交，1953年第1期作選出，品系名稱爲台中在來育2號，1966年第2期作登記推廣。

六、**品種特性**：耐旱，抗葉稻熱病，但不抗穗稻熱病，直鏈澱粉含量高。

七、**推廣及技術轉移情形**：


1966-1977年間主要於台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南等縣市種植，其中以1968年的栽培面積41,152公頃爲最廣，1976年後受低直鏈澱粉的秈稻品種(台中秈3號等)命名推廣影響，栽培面積急速減少。依現有資料，種植情形如下：



■ 台中秈2號之植株



■ 台中秈2號之稻穗



■ 台中秈2號之稻穀、糙米、白米



年別	種植面積 (ha)	縣 市	年別	種植面積 (ha)	縣 市
1965	1987	竹中雲	1981	1115	苗中彰
1966	30064	中(縣市)彰雲南東屏	1982	377	中彰
1967	33721	北部高苗以外之台灣地區	1983	121	中彰
1968	41152	宜基竹苗高以外之台灣地區	1984	227	中彰
1969	38546	北基竹高屏以外之台灣地區	1985	21	苗彰
1970	35395	北基高屏以外之台灣地區	1987	23	苗
1971	34111	北基高屏以外之台灣地區	1988	11	苗
1972	34086	北基高屏以外之台灣地區	1989	441	苗南
1973	30598	北宜基雲高屏以外之台灣地區	1990	337	苗南
1974	24237	中部地區桃竹苗雲嘉南	1991	34	苗南
1975	21179	中部地區竹苗雲嘉高花	1992	52	苗南
1976	13822	中部地區桃竹苗嘉花	1993	86	苗
1977	11073	中部地區桃竹苗嘉南	1994	157	苗中南
1978	3618	中部地區桃苗嘉南	1995	20	苗
1979	1429	中部地區桃苗南市	1996	77	中
1980	1384	中彰嘉南			